

# パブロン鼻炎アタックJL〈季節性アレルギー専用〉

指定第二类医薬品  
鼻炎用点鼻薬（点鼻薬）

◆パブロン鼻炎アタックJL〈季節性アレルギー専用〉のベクロメタゾンプロピオン酸エステルは、患部でよく効き、体内に吸収されると分解される全身性作用が少ないアンテドラグ型ステロイドです。■有効成分が霧状の微粒子となって鼻の奥深くまで均一にいきわたり、薬液が炎症患部でジェル化するので液だれしにくく、スーッとした使用感の点鼻薬です。

## 効能・効果

花粉など季節性アレルギーによる次のような症状の緩和：鼻づまり、鼻水（鼻汁過多）、くしゃみ

## 用法・用量

通常、次の量を左右の鼻腔内に噴霧してください

成人（18才以上）、左右の鼻腔内にそれぞれ1回1度ずつ噴霧、1日2回（朝・夕）  
18歳未満、使用しないこと

本剤はベクロメタゾンプロピオン酸エステル（ステロイド）を配合していますので、過量に使用したり、間違った使用方法で使用すると、副作用が起こりやすくなる場合がありますので、定められた用法・用量を厳守して下さい。  
点鼻用にのみ使用してください。

## 成分及び分量

100g中  
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 0.1g

## 添加物

ベンザルコニウム塩化物、ポリソルベート80、セルロース、カルメロースナトリウム(CMC-Na)、グリセリン、プロピレングリコール、クエン酸Na、クエン酸、D-マンニトール、粉糖、トウモロコシデンプン、セルロース、無水ケイ酸、クロスボドン、ヒドロキシプロピルセルロース、アスパルテム（L-フェニルアラニン化合物）、スクラロース、ステアリン酸カルシウム、l-メントール、香料

## 使用上の注意

### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

次の人は使用しないでください。

次の診断を受けた人。

全身の真菌症、結核性疾患、高血圧、糖尿病、反復性鼻出血、ぜんそく、緑内障、感染症

鼻孔が化膿（毛根の感染によって、痛みやはれを伴う）している人

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

18才未満の人。

妊婦又は妊娠していると思われる人。

ステロイド点鼻薬を過去1年のうち3か月以上使用した人

本剤は、他のステロイド点鼻薬の使用期間も合わせて、1年間に3か月を超えて使用しないでください（3か月を超えた使用が必要な場合には、他の疾患の可能性があるので耳鼻咽喉科専門医にご相談ください）

本剤の使用後は、ステロイド点鼻薬を使用しないでください。ただし、医師から処方された場合はその指示に従ってください

## 相談すること

●次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

医師の治療を受けている人。

減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人

頭、額や頬などに痛みがあり、黄色や緑色などの鼻汁のある人（感染性副鼻腔炎）。

授乳中の人。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

季節性アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。

高齢者。

肥厚性鼻炎や鼻たけ（鼻ポリープ）の人。

※1：鼻のまわりが重苦しく、少量の粘性性又は黄色や緑色の鼻汁がでる。

※2：鼻づまり、鼻声、鼻の奥の異物感などがある

長期又は大量の全身性ステロイド療法を受けている人

●使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

鼻：

鼻出血、鼻の中のかさぶた、刺激感、かゆみ、乾燥感、不快感、くしゃみの発作、嗅覚異常、化膿症状（毛根の感染によって、膿（うみ）がたまり、痛みやはれを伴う）

のど：

刺激感、異物感、化膿症状（感染によって、のどの奥に白っぽい膿（うみ）がたまり、痛みやはれを伴う）

皮膚：  
発疹・発赤  
かゆみ  
はれ  
精神神経系：  
頭痛  
めまい  
消化器：  
吐き気  
嘔吐  
下痢  
食欲不振  
循環器：  
動悸  
その他：

ぜんそくの発現、目の痛み、目のかすみ、血圧上昇

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

ショック（アナフィラキシー）：使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。頭、額や頬などに痛みがでたり、鼻汁が黄色や緑色などを呈し、通常と異なる症状があらわれた場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

他の疾病が併発していることがある

1週間位（1日最大4回（8噴霧まで））使用しても症状の改善がみられない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

小児の手のとどかない所に保管してください。

他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）

他の人と共用しないでください

使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6か月以内に服用してください。（品質保持のため）

11

### 【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。