



クラリチンEXは、薬剤師からの説明を受け、添付文書をよく読んでお使いください。不明な点がある場合は、薬剤師に相談してください。

| | |
|---|--|
| 用法・用量 | 成人（15才以上）、1回1錠、1日1回食後に服用してください。なお、毎回同じ時間帯に服用してください。 |
| 効能・効果 | 花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：鼻みず、鼻つまり、くしゃみ |
| 形状 | 白色 6.5mm  |
| 成分・分量 | 添加物：乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg クラリチン 10mg 1日量：1錠中 （有効成分） |
|  | |



要指導医薬品

クラリチン[®]EX

適正使用のためのチェックシート



大正製薬株式会社

適正使用のためのチェックシート

クラリチンEXは、花粉・ハウスダスト（室内塵）などによる鼻みず・鼻づまり・くしゃみの症状を緩和するアレルギー専用鼻炎薬です。

本剤を購入する前に以下の「チェック項目」を確認してください。

1 次の項目がひとつでも「YES」に該当する場合は、本剤の服用はできませんのでご注意ください。

- | | YES | NO |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ● 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 15才未満の小児 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ひとつでも「YES」がある場合は、
服用いただけません

すべて「NO」の場合は、
②へお進みください

2 (①の項目がすべて「NO」の場合)
以下の場合に該当するか、更にご確認ください。ひとつでも「YES」に該当する場合は、
本剤が服用できないことがあるため、医師又は薬剤師にご相談ください。

- | | YES | NO |
|---|--------------------------|--------------------------|
| ● 医師の治療を受けている人 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 次の診断を受けた人 肝臓病、腎臓病、てんかん | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● アレルギー性鼻炎か、かぜ、副鼻腔炎など他の原因によるものかわからない人 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎などの他のアレルギー疾患の診断を受けたことがある人 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 妊婦又は妊娠していると思われる人 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 高齢者 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ひとつでも「YES」がある場合は、
本剤が服用できない場合があるため
医師又は薬剤師にご相談ください

すべて「NO」の場合は、
本剤を服用いただけます

上記の質問から服用可能な場合は、次のことを必ず守ってください。

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
 - ・他のアレルギー用薬（皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む）、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬等）
（本剤と類似の作用を持つ成分については、併用により副作用が強くあらわれる可能性があります）
 - ・エリスロマイシン、シメチジン
（これらの医薬品との併用により、副作用が強くあらわれる可能性があります）
- 服用前後は飲酒しないでください。
（一般的にアルコールは、配合成分の吸収や代謝を促進することがあり、副作用が強くあらわれる可能性があります）
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
（本剤は、ヒト母乳中へ移行することが報告されています）
- 1週間位服用しても症状の改善がみられない場合には、医師（耳鼻科医等）又は薬剤師に相談してください。また、症状の改善がみられても2週間を超えて服用する場合は、医師（耳鼻科医等）又は薬剤師に相談してください。