

# BIOFERMIN®

## INTESTINAL REGULATION CHEWABLE® a

- 聚二甲矽烷消除產生的氣體氣泡<sup>\*</sup>，決明子能調整腸道功能，改善腹部的脹滿感。(※氣體氣泡：氣泡狀的氣體)
- 乳酸菌（雙歧桿菌、Lactomin）能抑制產生腸道氣體的壞菌增加，調整腸內環境以致難以產生氣體。
- 泛酸鈣有助腸道乳酸菌生長。
- 無須配服開水，可直接服用的優酪乳口味咀嚼錠。

### 療效

腹部膨脹感，整腸（通便），便秘，軟便

### 用法及用量

以下份量，請每隔 4 小時以上服用，嚼碎或於口中溶解後吞服。

15 歲以上，每次 1 片，1 天 3 次

未滿 15 歲者，請勿服用

### 用法及用量相關的注意事項

- 請嚴守用法及用量。
- 本劑請務必嚼碎或於口中溶解服用。  
(如直接吞服可能阻塞喉嚨)

### 成分

3 錠中（15 歲以上的每日服用量）

雙歧桿菌 30mg

Lactomin 乳酸菌 30mg

決明子提取物 120mg（由約 1,200mg 決明子萃取而來）

聚二甲矽烷 180mg

泛酸鈣 S 34.6mg（等同於泛酸鈣 22.5mg）

### 添加劑

玉米澱粉、赤藻糖醇、無水矽酸、纖維素、還原麥芽糖漿、糖粉、白糖、羥丙基纖維素、抗壞血酸、CMC-Ca、硬脂酸鎂、乳酸鈣、三氯蔗糖、阿斯巴甜（L-苯丙氨酸化合物）、香料

### 成分相關的注意事項

- 本產品由天然藥材（藥用草根樹皮等）製成，根據產品的不同藥劑的顏色、味道可能有所差異，但藥效不變。
- 由於含決明子成份，因此藥劑可能出現黑點，品質無虞，請安心服用。

### 使用上的注意事項

#### 諮詢事項

- 下列人士服用前請諮詢醫師，藥劑師或登錄販賣者  
正在接受醫師治療的人。  
接受過下列診斷的人。  
苯酮尿症
- 如服用 2 週左右症狀仍未獲改善，請停止服用，攜帶附件，諮詢醫師，藥劑師或登錄販賣者

### 保管及使用上的注意事項

- 請蓋緊瓶蓋並保管於避免陽光直射，濕氣較少的陰涼處。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 請勿換裝於其他容器。(可能造成誤用或產品變質)
- 開瓶後請將容器中填充物丟棄。(將填充物再次放入容器中可能因所吸收的濕氣而造成錠劑變質。填充物為防止運送過程中錠劑破損之用。)
- 每次服用後請旋緊瓶蓋。(避免吸收其他氣味或因濕氣而造成變質。)
- 請勿服用超過使用期限的產品。
- 請於包裝盒及瓶身的「開封年月日」欄中填寫開封日期。
- 基於品質考量，一旦開封，請於開封日起 6 個月內儘速服用完畢。

**【提供多語言產品資訊時的免責聲明】**

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。