

PRESER S SUPPOSITORIES

指定第二类医药品
痔疮用外用药

◆PRESER S栓剂含有缓解炎症的hydrocortisone acetate等对于痔疮治疗有效的成分。这些成分发挥作用，缓解痛感、出血、肿胀、发痒等痔疮症状。

效能或效果

缓解肛裂、痔核疼痛、出血、肿胀、发痒

用法及用量

请按以下用量插入肛门内：

15岁以上，1天1~3次，1次1粒

未满15岁，不宜服用

在使用之前洗澡或用温水清洗患处，早上在排便后、晚上在入睡前使用的话，效果会更好。

请严格遵守规定的用法用量。

本药剂过软时，请冷却一段时间后使用。

此外，如果过硬，请置于室温一段时间，变软后使用。

仅限用于肛门。

成分及分量

1粒 (1.65 g) 中

Hydrocortisone acetate 5mg

Lidocaine 60mg

l-Menthol 9mg

Allantoin 10mg

Tocopherol Acetate 50mg

Chlorhexidine Hydrochloride 5mg

添加剂

Carboxyvinyl polymer, anhydrous silicic acid, Hard fat

使用注意事项

禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用)

● 下述人群不要使用

因本药剂或本药剂成分chlorhexidine引起过过敏症状的人群

患处化脓的人群。

● 不要长期连续服用

咨询事项

● 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师治疗的人群

孕妇或有其可能性的人群

因药物等出现过过敏症状的人群

使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者

皮肤：

起疹、发红

发痒

红肿

其他：

刺激感

化脓

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

休克（过敏性）：使用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。

即使使用10日左右仍不见症状好转时，请停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的30℃以下的阴凉场所

请保管在儿童无法触及的地方。

保管时，请将栓剂的前端向下放进外箱中，并沿着外箱的标记立着保管

请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）

请勿使用超过使用期限的产品。

且，即使在使用期限内，开封后请尽快使用。（为了保证质量）

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任