

療效或效果

身體疲勞、病中病後、營養障礙、發熱性消耗性疾患
食欲不振
懷孕哺乳期等的營養補充
滋養強身
虛弱體質

用法及用量

成人（15歲以上）1天1次1枝（50mL）服用。
未滿15歲者，請勿服用
請務必遵守規定用法、用量。
本劑含天然藥材成分，如有沉澱屬正常現象，藥效並不受影響。
請充分搖勻後再行服用。

成分及分量

50mL 中
Taurine (Aminoethyl Sulfonic Acid) 1500mg
Royal jelly 200mg
Ginseng viscous extract 90mg (equivalent to 630 mg of the crude drug)
Astragalus Root Fluid Extract-C 0.2mL (equivalent to 200 mg of the crude drug)
Morinda Officinalis Root Fluid Extract 0.2mL (equivalent to 200 mg of the crude drug)
Thiamine Nitrate 5mg
Riboflavin sodium phosphate 5mg
Pyridoxine Hydrochloride (vitamin B6) 5mg
Tocopherol acetate 30mg
Nicotinamide 20mg
Inositol 100mg
Anhydrous caffeine 50mg

添加劑

Sugar, D-Sorbitol, Sucralose, Acesulfame K, Povidone, Glycerol fatty acid ester, Polyoxyethylene hydrogenated castor oil, Glycerin, Sodium benzoate, citric acid, Sodium citrate, flavor, alcohol, Vanillin (not more than 0.2mL)

成分及分量相關的注意事項

因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色，此為本藥劑所含維生素B2的影響，無須擔憂

使用上的注意事項

諮詢事項

服用後，出現下列症狀即可能為副作用影響，請立即停止服用並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚：
發疹
消化器官：
胃部不適感
服用後可能出現下列症狀，如該症狀持續或加重時，請停止服用並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
腹瀉
持續服用一段時間症狀仍未見改善時，請停止服用並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射的陰涼處保管
請置於兒童無法觸及之處保管。
請勿服用超過使用期限的產品。

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。