

RiUP regenne为对于女性的早年秃发，其效能、效果已被认可的“医药品”。着眼于女性的头皮，在minoxidil生发成分上加了整顿头皮环境的成分。

效能或效果

用于早年秃发的生发、育发以及预防持续脱发（掉发）

用法及用量

成年女性（20岁以上）请按1天2次、1次1mL涂抹在脱发的头皮部位。

与脱发范围的大小无关，请遵守1次使用1mL。1mL是作为如果涂抹开，头皮整体都会充分涂抹到的量设计的。

此外，容器可以计量1mL。

即使超过规定用法用量的范围大量使用或频繁使用，效果也不会更好。请严格遵守规定的用法用量。

（即使超过规定量大量使用，效果几乎不会更好，反而出现副作用的可能性会变高）

长头发的人使用时，请把头发分开，药液不要弄到头发上而仔细涂抹在头皮上。

用粘着药液的手触摸眼睛等粘膜会有刺激，粘在手上的药液请仔细洗掉。

注意不要入眼。不慎入眼时立即用冷水或温水进行清洗。症状严重时应前往眼科就诊。

请注意不要粘在有可能溶化于乙醇等的物品（眼镜框、化学纤维等）。

请在使用本药剂之后再使用整发液以及整发喷雾。

使用染发剂（染色、染发、染白发等）时，请在染色完全结束后使用本药剂。

接发或戴假发的人，请充分弄干本药剂后再戴上。

成分及分量

100mL中

Minoxidil 1.0g

Pantothenyl ethylether 1.0g

Tocopherol Acetate 0.08g

l-Menthol 0.3g

添加剂

1,3-Butylene glycol,citric acid,Anhydrous ethanol,Sodium hyaluronate

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故）

下述人群请不要使用。

因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群

未成年人群（未满20岁）。

在国内没有使用经验。

孕妇或有其可能性的人群，以及处于哺乳期的人群。

对于孕期的使用，其安全性没有被充分验证。此外，minoxidil会转移到母乳中。

因怀孕、分娩引起脱发的人群。

早年秃发以外的脱发症的可能性较高。

因停止服用口服避孕药而引起脱发的人群。

早年秃发以外的脱发症（例如，甲状腺疾病、急剧的减肥、斑秃等）的人，或不明原因的脱发症人群

本药剂仅对早年秃发有效。

不仅是头顶部位，头部整体包括头侧部位及后脑部位均有脱发的人群。

有可能是相比男性在女性中多见的因甲状腺疾病引起的脱发等，早年秃发以外的脱发症或脱发因其他原因引起。

急速脱发或头发呈斑状脱落的人群。

早年秃发以外的脱发症的可能性较高。

因头皮被强拉的发型引起脱发的人群。

早年秃发以外的脱发症的可能性较高。

男性。

男性请使用RiUP系列的男性用产品。

请不要用于下述部位。

本药剂仅限用于头皮部位，请勿内服。

有可能使血压下降等。

有伤口、湿疹或炎症（发红）等症状的头皮。

有可能使伤口等加重。

使用本药剂时，请避免使用其他生发剂以及外用剂（软膏、液体剂等）。此外，使用这些药剂时请停止使用本药剂。

这些药剂有可能对本药剂的吸收产生影响。

咨询事项

下述人群在使用前，请咨询医生或药剂师。

曾经因药物或化妆品等出现过过敏症状（例如，起疹发红、发痒、斑疹等）的人群。

高血压人群、低血压人群。

本药剂有可能对血压产生影响。

有心脏或肾脏疾病的人群。

本药剂有可能对心脏以及肾脏产生影响。

有浮肿的人群。

有可能加重浮肿。

家族、兄弟姐妹中没有早年秃发的人。

对于早年秃发的发病，认为遗传性因素较大。

老年人（65岁以上）。

一般在老年人身上会容易出现不好的症状。

接受下述诊断的人群。

甲状腺功能障碍（甲状腺功能减退症、甲状腺功能亢进症）。

可能因为甲状腺疾病引起脱发。

使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止使用，并携带本说明书咨询医生或药剂师

皮肤：头皮的起疹和发红*、发痒、斑疹、头皮屑、使用部位的发热等

精神神经系统：头痛、神志不清、头晕

循环系统：胸痛、心率加快

代谢系统：不明原因体重急剧增加、手脚肿胀

*：有时也会出现在头皮以外的部位。

使用6个月以后，下述的任何症状都没有改善时，请停止使用，并携带本说明书咨询医生或药剂师。

有可能是相比男性在女性中多见的因甲状腺疾病引起的脱发等，早年秃发以外的脱发症或脱发因其他原因引起。

脱发状态的程度、长出胎发软发、长出硬发、脱发的程度（不仅是粗发，细短脱发的减少也是改善的目标）。

即使在开始使用后的6个月以内，如果出现脱发状态的恶化或下述的脱发症状，请停止使用，并携带本说明书咨询医生或药剂师。

不仅是头顶部位、头部整体包括头侧部位及后脑部位均有脱发，除头发以外的掉毛、斑状脱发、急剧的脱发等。

有可能是相比男性在女性中多见的因甲状腺疾病引起的脱发等，早年秃发以外的脱发症或脱发因其他原因引起。

■其他注意事项

毛发的成长需要时间。请每天使用至少6个月，直到确定效果。

本药剂被认定使用6个月后生效。

毛发成长的程度因人而异，本药剂并非对任何人都有效果。

要维持效果必须继续使用，如果停止使用会逐渐恢复原来的状态。

本药剂并不能清除早年秃发的原因。

保管及使用注意事项

使用后盖好盖子，避开阳光直射或高温、寒冷的场所，置于阴凉场所保管。

请保管在儿童无法触及的地方。

为了避免误用，并保证质量，请不要移至其他容器中。

请勿靠近烟火。

请勿服用超过使用期限的产品。

33

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

·本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。

·多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。

·多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。

·关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担一切责任